

Készítmény neve	Hatóanyag	Károsító	Kultúra	A kezelések évenkénti maximális száma	Dózis (kg, l/ha)	Élőírást-egészségügyi várakozási idő	Előírt növényvédelmi technológia	Feliszíni vízeztől mért biztonsági sáv
Bactospoinea WG, Dipel DF	Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki	amerikai fehér medvelepke	bogyós gyümölcsfák (málna, szeder, köszmété, ribiszke, fekete bodza, szamóca)	8	1,0-1,5	2	a fiatal lárvastádiumok ellen kell alkalmazni (L1-L2)	5 m
			héjas gyümölcsűfák (dió, mandula, mogyoró, szelídgesztenye)	8	1,0-1,5	2		
Foray 76B	Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki	amerikai fehér medvelepke	lombhullató erdei fafajok (kőzterületen is)	4	2,0-2,5	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	a fiatal lárvastádiumok ellen kell alkalmazni (L1-L2)	5 m
			fenyőfélék (kőzterületen is)	4	2,0-2,5			
			díszfák, díszcserjék (kőzterületen is)	4	2,0-2,5			
Kaiso EG, Hunter, Jager EG, K1, Wakizasi	lambda-cihalotrin	amerikai fehér medvelepke	fekete bodza	1	0,3	14	a permeterézést a fiatal (L1-L2 fejlődési állapotú) lárvák ellen kell időzíteni	50 m
			lamba-cihalotrin	1	0,3	14	a permeterézést a fiatal (L1-L2 fejlődési állapotú) lárvák ellen kell időzíteni	50 m
Kaiso Garden	lamba-cihalotrin	amerikai fehér medvelepke	fekete bodza	2	0,3	14	a permeterézést a fiatal (L1-L2 fejlődési állapotú) lárvák ellen kell időzíteni	50 m
			lamba-cihalotrin	2	0,3-0,6	14	a permeterézést a fiatal (L1-L2 fejlődési állapotú) lárvák ellen kell időzíteni	50 m
Karate Zeon 5 CS, Full 5 CS, Ninja Zeon	lamba-cihalotrin	amerikai fehér medvelepke	fekete bodza	2	0,3	14	a permeterézést a fiatal (L1-L2 fejlődési állapotú) lárvák ellen kell időzíteni	50 m
			lamba-cihalotrin	2	0,3-0,6	14	a permeterézést a fiatal (L1-L2 fejlődési állapotú) lárvák ellen kell időzíteni	50 m
Decis	deltametrin	lombbrágó hernyók	lombhullató dísznövények (díszfák, díszcserjék)	-	0,2-0,25 (kiskerti dózis: 2,0-2,5 ml/10 l víz)	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	a fiatal (L1-L2) lárvák megjelenésekor szükséges permeterezni	50 m
			lombhullató dísznövények (díszfák, díszcserjék, díszfaiskola)	3	0,2-0,25	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	a fiatal (L1-L2) lárvák megjelenésekor szükséges permeterezni	50 m
Deltam	deltametrin	lombbrágó hernyók	dísznövények	3	5 ml/100 m ²	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	az L1-L2 fejlődési stádiumú lárvák ellen kell védekezni	25 m
			eszfenvalerát	2	0,1-0,3 (kiskerti dózis: 6,0 ml/10 l víz)	14		
Sumi Alfa 5 EC	eszfenvalerát	lombbrágó hernyók	almatermésfélék, csonthéjasok	2	0,1-0,3 (kiskerti dózis: 6,0 ml/10 l víz)	14		20 m