

VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, mint növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró szerv (továbbiakban élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) a szőlő arany színű sárgaság fitoplazma (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*) zárlati károsítót terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen az alábbi védekezési felhívást teszi közzé:

VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által a Balaton-felvidéki Borvidék és a Badacsonyi Borvidék szőlőültetvényeiben elvégzett felmérések szerint az amerikai szőlőkabóca (*Scaphoideus titanus*) lárvakelése 2023. évben május utolsó hetében kezdődött meg, az első lárvastádiumú egyedek a vizsgált szőlőnövényeken mindenhol megtalálhatóak voltak. Az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés azért különösen fontos, mert a szőlő egyik veszélyes betegsége, a szőlő arany színű sárgaság betegséget okozó *Grapevine flavescence dorée* zárlati károsító (a továbbiakban: zárlati károsító) járványszerű terjedésében játszik szerepet.

A szőlő arany színű sárgaság betegség az elmúlt években a Balaton-felvidéki és a Badacsonyi Borvidékeken egyre több helyen azonosításra került, ami miatt az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a Badacsony-hegyen, a Tóti-hegyen, a balatonedericsi Öreghegyen, a Csobánc-hegyen, Hegyesd település határában, a lesencetomaji, lesenceistvándi és lesencefalusi zártkertekben, a Szent György-hegyen, Mindszentkálán, Révfülöp és Szigliget települések szőlőültetvényeiben növényegészségügyi zárlatot rendelt el, illetve határaiktól számított 3 km sugarú részeken puffer zónákat (továbbiakban együtt: körülhatárolt terület) jelölt ki. A felsorolásból is látszik, hogy a betegség okozó kórokozó a borvidékeken majdnem mindenhol kimutatásra került, egyes szőlőültetvényekben már jelentős kárt is okozott. Az amerikai szőlőkabócáról is elmondható, hogy az elmúlt évek során a Badacsonyi Borvidék és a Balaton-felvidéki Borvidék szőlőültetvényeiben egyaránt megtalálható. A lárvái egyre több ültetvényben, egyre nagyobb egyedszámban fellelhetők, a sárgalapok pedig nagy egyedszámban, a védekezési küszöb felett fogják a kifejlett szárnyas egyedeket.

Ezek miatt az amerikai szőlőkabóca a már fertőzött ültetvényekben újabb és újabb szőlőnövényeket fertőz meg, illetve a még nem fertőzött ültetvényekben megbetegedést okoz. Mivel a fertőzött szőlőnövényeket gyógyítani nem lehet, a védekezés csak a megelőzésre szűkül, ezért különösen fontos a szőlőültetvényekben a zárlati károsító járványos elterjedésében szerepet játszó amerikai szőlőkabóca, mint vektor elleni védekezés. A körülhatárolt területeken - az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv növényegészségügyi zárlatot elrendelő határozatai alapján - kötelező a rovarvektorok ellen évente 3 alkalommal történő növényvédő szeres védekezés, melyet a védekezés optimális idejére vonatkozó hirdetményi úton közzétett védekezési felhívások figyelembevételével kell végrehajtani.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv vizsgálatai szerint a Badacsonyi Borvidék és Balaton-felvidéki Borvidék szőlőültetvényeiben **az amerikai szőlőkabóca tömeges lárvakelése 2023. évben május utolsó hetében volt tapasztalható.** Erre, illetve a szőlőnövények fejlettségére tekintettel a lárvák elleni **első kezelést a szőlő virágzása után, de legkésőbb június utolsó hetében, a második kezelést, ez első kezelés után 2-3 hét múlva, legkorábban júliusban, de legkésőbb július második dekádjában kell elvégezni.**

A kifejlett egyedek elleni harmadik kezelésre újabb védekezési felhívás kerül kiadásra a kabóca csapdák fogási eredményei alapján.

A védekezésre a felhívás mellékletének táblázatban szereplő rovarölő szerek alkalmazhatók.

Megjegyzendő, hogy az amerikai szőlőkabóca fiatal lárvái a szőlőnövények törzsein található hajtásokon is táplálkozik, ezért az eredményes védekezés feltétele, hogy a kötelező kezelések előtt a szőlőnövényeken a törzstisztítás elvégzésre kerüljön, vagy amennyiben nem történik meg, a kezelések a tőhajtásokat is érik. Továbbá a védekezés hatékonyságát növeli, ha a lárvák elleni védekezés során legalább egyszer felszívódó növényvédő szer kerül felhasználásra.


Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felhívja a szőlőtermelők figyelmét, hogy a védekezés során az integrált növényvédelem alapelveinek érvényre jutása érdekében a növényvédelmi technológia meghatározása során figyelemmel kell lenni a rezisztencia kialakulásának megelőzésére, ezért a növényvédő szerek okirataiban meghatározott kezelések évenkénti maximális számának betartása mindenkor szükséges. Ezen túl figyelmet kell fordítani a növényvédő szer használat sorrendjére is, hogy az utolsó, harmadik kezelés során olyan növényvédő szert tudjanak még kijuttatni, amely az akkori szőlő fenosztádiumban még engedélyezett és az ételmezés-egészségügyi várakozási idő is betartható legyen, valamint védelmet nyújtson az amerikai szőlőkabóca kifejlett alakja ellen is.

Jelen felhívás az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv szakmai javaslatának is tekintendő, így az agrár-környezetvédelmi programban szereplő támogatást igénylők egyszeri alkalmazásra az engedélyben foglaltaknak megfelelően felhasználhatják a környezetkímélő besorolásba nem került növényvédőszer-hatóanyagokat. Az agrár-ökológiai programban pedig a méhekre veszélyes szerek használati tilalma ültetvényekben gyakorlatot választóknak az engedélyokirat alapján méhekre kifejezetten vagy mérsékelten veszélyes, illetve kockázatos besorolású növényvédő szerek használata tilos.

Veszprém, 2023.06.05.

Takács Szabolcs főispán
nevében és megbízásából:




Odor Tamás
osztályvezető

1. számú melléklet a 2023. évi védekezési felhíváshoz

	Kabócák ellen engedélyezett szerek szőlőben	Hatóanyag	Forgalmazási kategória	A kezelés évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam	Az utolsó kezelés fenostádiuma	Méhveszélyesség
Kontakt	Decis ¹	deltametrin	III.	-	14 nap	zsendülés (BBCH 85)	mérsékelt kockázatos
	Decis Mega ¹	deltametrin	II.	3	14 nap	zsendülés (BBCH 85)	mérsékelt kockázatos
	Decis Forte ¹	deltametrin	I.	2	14 nap	szedés érettség (BBCH 15- 87)	mérsékelt kockázatos
	Detector ¹	deltametrin	I.	2	14 nap	szedés érettség (BBCH 15- 87)	mérsékelt kockázatos
	Kaiso Garden ²	lambda-cihalotrin	III.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt kockázatos
	K1 ²	lambda-cihalotrin	III.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt kockázatos
	Kaiso EG ²	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt veszélyes
	Kaiso Sorbie ²	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt veszélyes
	Wakizasi ²	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt veszélyes
	Hunter ²	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt veszélyes
	Jager EG ²	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt veszélyes
	Karate Zeon 5 CS ²	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt kockázatos
	Karate Zeon 050 CS ²	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt kockázatos
	Ninja Zeon 5 CS ²	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt kockázatos
	Full 5 CS ²	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt kockázatos
	Lamdex Extra ²	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt veszélyes
	Klartan 24 EW	tau-fluvalinát	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)	nem jelölésköteles
	Mavrik 24 EW	tau-fluvalinát	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)	nem jelölésköteles
	Monospel 24 EW	tau-fluvalinát	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)	nem jelölésköteles
	Laser	spinozad	II.	2	7 nap	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)	mérsékelt kockázatos
	Nexsuba	spinozad	II.	2	7 nap	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)	mérsékelt kockázatos
	Laser Duplo ³	spinozad	II. ; III.	2	7 nap	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)	mérsékelt kockázatos
	Pyregard ³	piretrin	III.	2	-	2023. augusztus 22-ig	kifejezetten veszélyes
Felszívódó	Sivanto Prime ^{2,4}	flupiradifuron	II.	1	-	zsendülés (BBCH57-81)	nem jelölésköteles ⁴
	Sanium System ²	flupiradifuron	II. ; III.	1	-	érés kezdete (BBCH 57-82)	nem jelölésköteles
	Exirel ¹	ciántraniliprol	I.	2	14 nap	zsendülés (BBCH 71-85)	kifejezetten veszélyes
	Mospilan 20 SG ⁴	acetamiprid	III.	1	-	érés (BBCH 89)	nem jelölésköteles
	Rafting ⁴	acetamiprid	III.	1	-	érés (BBCH 89)	nem jelölésköteles
	Spilan 20 SG ⁴	acetamiprid	III.	1	-	érés (BBCH 89)	nem jelölésköteles
	Gazelle 20 SG ⁴	acetamiprid	III.	1	-	érés (BBCH 89)	nem jelölésköteles

Megjegyzés:

¹ agrár-környezetvédelmi programban tiltott, de egy alkalommal a kormányhivatal szakmai javaslata alapján felhasználható

² agrár-környezetvédelmi programban csak növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó, növényvédelmi mérnök, növényorvos írásbeli javaslatára használható

³ ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett a felhasználása

⁴ tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként alkalmazva, virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki.

Hitelesítési záradék

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.




aláírás