

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2026-07-02

(27. hét)

Fenofázis: zöldborsó nagyság, fürtzáródás előtt, fürtzáródás

Megérkezett a felfrissülés és a várva várt eső is!

A természet fellelegzett, mi is fellelegezhetünk egy kis időre.

Elérkezett az amerikai szőlőkabóca elleni kötelező második védekezés elvégzésének ideje (július 1.-július 7.).

A borvidéken a késői fajták zöldborsó nagyságban, a korai és középérésű fajták fürtzáródás előtt, fürtzáródásban vannak.

Múlt héten Badacsonyan csapadék nem volt. Forróság és légköri aszály annál inkább.

Tegnap berobogó hidegfronttal (07.01.) 3,5 mm esett Badacsonyan viharos szél kíséretében.

Enyhülést hozott, de kellő mennyiségű csapadékot sajnos nem.

Aszály van és továbbra is aszályra kell felkészülni főleg az új és fiatal telepítésű szőlőültetvényeknél.

A borvidéken a késői fajták zöldborsó nagyságban, a korai és középérésű fajták fürtzáródás előtt, fürtzáródásban vannak.

A növényvédelmi előrejelző készülékek a fülledt meleg időjárásnak köszönhetően **közepes lisztharmat veszélyt** jeleznek. A „sivatagi” forró körülmények (magas hőmérséklet, alacsony relatív páratartalom) a légköri aszály nem kedvezett a kórokozóknak sem. A gombák aktivitását is csökkentette. Hihetetlen, de a kaliforniai rizikómodell folyamatosan csökkent és jelenleg 0 indexértéket jelez. A fertőzési nyomás alacsony, de a tegnapi csapadéknak köszönhetően újabb fertőzés kialakulására volt esély. A bogyók héja kezd elviaszosodni, melynek következtében a szőlőfürtök ellenálló képessége a lisztharmattal szemben egyre inkább érvényesül. Ez viszont nem azt jelenti, hogy védekezni ellene nem szükséges. Mind ezt figyelembe véve lisztharmat ellen kontakt és felszívódó készítményekkel védekezni kell!

Peronoszpóra veszély jelenleg alacsony preventív (megelőző) védekezés javasolható kontakt vagy (az időjárási előrejelzéseket figyelembe véve) felszívódó készítmények alkalmazásával. Nagyobb mennyiségű csapadék (az előrejelzések alapján a következő napokban) sajnos már nem várható.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján nem szükséges.

Feketerothadás veszélye alacsony a száraz időjárásnak köszönhetően.

25C° felett a növényvédő szerek perzselést okozhatnak!

Egyre gyakoribb az ESCA-s tőke a szőlőkben.

A fitoplazma tünetek is megjelentek. A tavaly fertőzött tőkék már „dobják ki” a fitoplazma tüneteit. **Most jött el a „hegy” bejárások az ideje!** Az második rovarölőszeres kezelést követően a fertőzés gyanús tőkéket célszerű megjelölni, a hajtásokat levágni és lehetőleg minél hamarabb eltávolítani gyökerestől az ültetvényből a további fertőzés elkerülésének érdekében. Az amerikai szőlőkabóca (L₁-L₂) lárvája még nem fertőz, de a további lárvastádiumok már fertőzni képesek, ha egy beteg tőkéből felvették a kórokozót. **A gócpontokat mihamarabb fel kell számolnia mert már az idősebb lárvák olyan fejlettségbe kerültek, hogy a szőlő aranszínű sárgaság fitoplazmát terjeszteni már képesek.** Az ESCA-s szőlőtőkét részleges amputálásokkal egypár évig, még tünetmentesen életben lehet tartani, de a **fitoplazmás tőkék esetében jelenleg nincsen gyógyítási lehetőség.**

Figyelem: Szerdán megérkezett a hidegfront, amely kisöpörte a szinte már-már elviselhetetlen hőséget. Csütörtöktől egészen jövőhét elejéig 26- 28 °C maximum hőmérséklet várható. Szeles napoknak nézünk elébe. Az időjárási előrejelzések alapján a mostani számítások szerint „jelentősebb” csapadék vasárnapra várható.

A növényvédelmi fordulók, valamint a **zöldmunkák** időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében.

A hatalmas hajtásnövekmény dunsztot képez a szőlősorokban. Törekedni kell a mihamarabbi hajtásigazítás és a csonkázás elvégzésre, természetesen a gyomirtásról se feledkezzenek el.

A zöldmunkákat nem elhagyva, a napégést elkerülendő mérsékelt levelezzenek a fűrtzónában. Lehetőség szerint a lombfal nyugati oldalán a napégés elkerülése érdekében ne levelezzenek.

A korai és középerésű fajtáknál a permetezési fordulók tervezésénél a használni kívánt növényvédő szerek kiválasztása az élelmezésegészségügyi várakozási idők figyelembevételével történjenek!

Az ültetvényekben megjelent és fokozottan jelentkeznek a tápanyaghiány tünetei (vashiány (sárgulás), cink hiány, bór hiány stb.). Megelőzésre és „gyógyításra” levélvizsgálati eredményekre alapozva egyedi talajkezelés vagy ültetvényszinten lombkezelés (levéltrágya) javasolható.

Az amerikai szőlőkabóca és potenciálisan veszélyt jelentő egyéb kabócák ellen az első kötelező védekezést követően a védekezési felhívást figyelembe véve a második kötelező kifejezetten amerikai szőlőkabóca elleni védekezés is időszzerűvé vált (július 1- július 7). Badacsonyan az amerikai szőlőkabóca L₄-es lárváját megtaláltuk. A levelek fonákán a lárvabőrök jelenlétét is megfigyelhetjük a lárvákon kívül. **Kifejezetten a kabócák ellen akkor kell védekezni, amikor a lárvák zöme eléri az L₂ lárvastádiumot, de már megjelentek az L₃-as lárvák is.**

Az elhúzódozó lárvakelést jól jelzi, hogy még mindig vannak L₁-es lárvák. Törzstisztítás elvégzésével nagy mértékben csökkenthetjük a kikelt lárvák egyedszámát, valamint a kijuttatandó rovarölő szerek hatékonyságát. A fiatal L₁-es lárvák igen érzékenyek, a talaj közelében lévő törzshajtásokon érzi igazán jól magát. A törzshajtások eltávolításával kedvezőtlen életteret tudunk kialakítani számára.

A rovarölő szerek alkalmazásakor kellő körültekintéssel járjanak el! Méhveszélyesség szempontjából vannak kritériumok, amikor egyes készítmények nem (virágzó gyomok, virágzó kultúra), vagy korlátozásokkal (méhkímélő technológia) alkalmazhatók.

Kedves Izabella és egyéb más direkttermő szőlő és alany tulajdonosok, legyen az út szélén, ültetvényben, vagy akár lugason kérem Önöket, hogy ha más ellen nem is, de amerikai szőlőkabóca ellen permetezzék meg a tőkéiket. Megfigyeléseink szerint nagyobb számú kabócalárva és majd a későbbiek során kifejlett egyed található rajtuk, mint az európai szőlőfajtákon.

Kérem, kísérjék figyelemmel a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal megjelent 2026/I. védekezési felhívását!

A benne foglaltak minden szőlőtulajdonos számára kötelező!

A KABÓCÁK ELLENI VÉDEKEZÉS KÖTELEZŐ, NEM EGYÉNI, HANEM KÖZÖS ÉRDEK! EGYSÉGES VÉDEKEZÉS NÉLKÜL NINCS VÉDELEM!

Növényvédő szer ajánlat tekintetében kérjük kereskedőjüket, növényvédelmi szakirányítójuk segítségét, akik nagy szakértelemmel, legjobb tudásuk szerint segítik összeállítani az aktuális kezeléshez szükséges növényvédő szereket.

Badacsony, 2026. 07. 02.