

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2026-07-16

(29. hét)

Fenofázis: fűrtzáródás előtt, fűrtzáródás, zsendülés kezdet, zsendülés

A múlt héthez képest a hét eleje is hőséggel és légköri aszályokkal tarkítva kezdődött. Az elmúlt héten mérhető csapadék nem esett csak nyomokban pár csepp. Szerda reggelig (07.15) 0,6 mm eső volt, de ez sajnos még a port sem verte el. BBCH (fenológiai fázis) tekintetében visszatekeredett az idő. A fűrtök már nem gyarapodtak, inkább visszafejlődtek. A szőlő is túlélteni akar.

Aszály van és aszályra kell felkészülni főleg az új és fiatal telepítésű szőlőültetvényeknél. Elfogyott a víz. Az idősebb ültetvényekben is már jelentkeznek az aszály jelei. Hő- UV- és szárazság stressz. Napégés főleg az ültetvények lombfalának nyugati oldalán.

Ma hajnalban megérkezett a felfrissülés és a várva várt eső is!

Reggelig 0,3 mm esett. Most is esik, de mennyi lesz ma a vége az még bizonytalan. Bizakodó vagyok, de telhetetlen nem. Mindegy is minden cseppnek örülni kell ez már életmentő.

A természet fellélegzhet mi is fellélegezhetünk egy kis időre.

Remélem mindenkinek sikerült elvégezni időben az amerikai szőlőkabóca elleni második kötelező védekezést is.

Ezzel még nem tudtuk le a kabócák elleni védelmet. Folyamatos monitorozás mellett még szükség lesz legalább egy védekezésre idén.

A borvidéken a késői fajták fűrtzáródás előtt, fűrtzáródásban a korai és középérésű fajták fűrtzáródás végén zsendülésben vannak.

A növényvédelmi előrejelző készülékek a fülledt meleg időjárásnak köszönhetően **erős lisztharmat veszélyt** jeleznek. A tegnapi csapadéknak köszönhetően újabb fertőzés kialakulására volt esély. A bogyók héja kezd elviaszosodni, melynek következtében a szőlőfűrtök ellenálló képessége a lisztharmattal szemben egyre inkább érvényesül. Ez viszont nem azt jelenti, hogy védekezni ellene nem szükséges. Mind ezt figyelembe véve lisztharmat ellen kontakt és felszívódó készítményekkel védekezni kell!

Peronoszpóra veszély jelenleg alacsony, de a lehulló csapadék mennyiségétől függően erősödik. Preventív (megelőző) védekezés javasolható kontakt vagy (az időjárási előrejelzéseket figyelembe véve) felszívódó készítmények alkalmazásával. Nagyobb mennyiségű csapadék az előrejelzések alapján a mai napon várható.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján nem szükséges, de a záródó fajták esetében preventíven indokolt.

Feketerothadás veszélye alacsony a száraz időjárásnak köszönhetően, de csapadék függvényében ez is erősödni fog. A zsendülés előtt álló fajták esetében preventív védekezés javasolható.

25C° felett a növényvédő szerek perzselést okozhatnak!

Egyre gyakoribb az ESCA-s tőke a szőlőkben.

A fitoplazma tünetek is megjelentek. A tavaly fertőzött tőkék már „dobják ki” a fitoplazma tüneteit. **Most jött el a „hegy” bejárások az ideje!** Az második rovarölőszeres kezelést követően a fertőzés gyanús tőkékét célszerű megjelölni, a hajtásokat levágni és lehetőleg minél hamarabb eltávolítani gyökerestől az ültetvényből a további fertőzés elkerülésének érdekében. Az amerikai szőlőkabóca (L₁-L₂) lárvája még nem fertőz, de a további lárvastádiumok már fertőzni képesek, ha egy beteg tőkéből felvették a kórokozót. **A gócpontokat mihamarabb fel kell számolnia mert már az idősebb lárvák olyan fejlettségbe kerültek, hogy a szőlő arany színű sárgaság fitoplazmát terjeszteni már képesek.** Az ESCA-s szőlőtőkékét részleges amputálásokkal egypár évig, még tünetmentesen életben lehet tartani, de a **fitoplazmás tőkék esetében jelenleg nincsen gyógyítási lehetőség.**

Figyelem: Csütörtökön a megérkezett a hidegfront, amely kisöpörte a szinte már-már elviselhetetlen hőséget. Pénteken még ugyan 30-33 °C várható, de szombattól egészen jövőhét közepéig 26- 28 °C maximum hőmérséklet várható. Az időjárási előrejelzések alapján a mostani számítások szerint „jelentősebb” csapadék péntek éjjel várható. Ettől függetlenül a légkör és az előrejelzések bizonytalanok, lokálisan bármikor főleg a délutáni órákban kialakulhat zápor zivatar is.

A növényvédelmi fordulók, valamint a **zöldmunkák** időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében.

Törekedni kell a mihamarabbi hajtásigazítás és a csonkázás elvégzésre, természetesen a gyomirtásról se feledkezzenek el.

A zöldmunkákat nem elhagyva, a napégést elkerülendő mérsékelt levelezzenek a fürtzónában. Lehetőség szerint a lombfal nyugati oldalán a napégés elkerülése érdekében ne levelezzenek.

A korai és középérésű fajtáknál a permetezési fordulók tervezésénél a használni kívánt növényvédő szerek kiválasztása az élelmezésegészségügyi várakozási idők figyelembevételével történjenek!

Az ültetvényekben megjelent és fokozottan jelentkeznek a tápanyaghiány tünetei (vashiány (sárgulás), cink hiány, bór hiány stb.). Megelőzésre és „gyógyításra” levélvizsgálati eredményekre alapozva egyedi talajkezelés vagy ültetvény szinten lombkezelés (levéltrágya) javasolható.

Az amerikai szőlőkabóca és potenciálisan veszélyt jelentő egyéb kabócák ellen az első kötelező védekezést követően a védekezési felhívást figyelembe véve a második kötelező kifejezetten amerikai szőlőkabóca elleni védekezés is időszzerűvé vált (július 1- július 7).

Felgyorsultak az események. már nem csak Badacsonyan hanem az egész borvidéken megtalálhatjuk az amerikai szőlőkabóca kifejlett egyedeit (imágókat). A tömeges rajzás elindult! Az ültetvényekben még mindig található vegyes összetételű idősebb lárvák. **Folyamatos törzstisztításra van szükség.**

A két rovarölőszeres kezeléssel a helyben fejlődő lárváktól ültetvényeinket ki tudtuk „takarítani”, de a berepülő egyedektől nem. Szakmailag indokoltan ezért a 3. rovarölőszeres célirányosan a kifejlett kabócák elleni védekezést a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal újabb védekezési felhívását követően végezzék el, ami hamarosan kiadásra kerülhet!

A rovarölő szerek alkalmazásakor kellő körültekintéssel járjanak el! Méhveszélyesség szempontjából vannak kritériumok, amikor egyes készítmények nem (virágzó gyomok, virágzó kultúra), vagy korlátozásokkal (méhkímélő technológia) alkalmazhatók.

Kedves Izabella és egyéb más direkttermő szőlő és alany tulajdonosok, legyen az út szélén, ültetvényben, vagy akár lugason kérem Önöket, hogy ha más ellen nem is, de amerikai szőlőkabóca ellen permetezzék meg a tőkéiket. Megfigyeléseink szerint nagyobb számú kabócalárva és majd a későbbiek során kifejlett egyed található rajtuk, mint az európai szőlőfajtákon.

Kérem, kísérik figyelemmel a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal megjelent 2026/I. védekezési felhívását!

A benne foglaltak minden szőlőtulajdonos számára kötelező!

A KABÓCÁK ELLENI VÉDEKEZÉS KÖTELEZŐ, NEM EGYÉNI, HANEM KÖZÖS ÉRDEK! EGYSGES VÉDEKEZÉS NÉLKÜL NINCS VÉDELEM!

Növényvédő szer ajánlat tekintetében kérjük kereskedőjünk, növényvédelmi szakirányítójuk segítségét, akik nagy szakértelemmel, legjobb tudásuk szerint segítik összeállítani az aktuális kezeléshez szükséges növényvédő szereket.

Badacsony, 2026. 07. 16.